

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN ARDECHE MEUSE ISERE LOIRE RHONE SAVOIE HAUTE-SAVOIE

EDITION BAS-VIVARAIS

ABONNEMENT ANNUEL: 110 F

REGISTREUR RECEPTEUR S. E. A. F.



RÉGION RHONE-ALPES 65, rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 03

27 Octobre 1986

N° de série continue 133

Bulletin n° 23

Les agents du SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX assurent une permanence technique aux bureaux de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de PRIVAS tous les LUNDI, MERCREDI et VENDREDI matin de 8 h 30 à 12 h. Tél. 75.64.64.22 - Cécile PAYEN, André PORTIER.

Communiqué VIVACOOP : le service technique de la Coopérative tient une permanence dans ses bureaux de ST SERNIN les LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI matin de 8 h à 10 h - Tél. 75.35.23.11 - Christian PONSONNET, Frédéric AUBERT.

CERISIER : Bactériose - 3ème traitement dès réception

PECHER : Dépérissement Bactérien - Prévoyez votre 4ème traitement

POIRIER : Psylles - Traitement des adultes à partir de la fin du mois

POIRIER - POMMIER : Tavelure - En automne, réduisez l'inoculum des vergers les plus atteints

Chancres européens - En verger atteint, traitez au cuivre

V I G N E : Flavescence dorée - Avant le rougissement automnal, décelez les colorations anormales du feuillage

ARBRES FRUITIERS

=====

CERISIER

BACTERIOSES - 3ème traitement dès réception, s'il n'est déjà réalisé. Une dernière intervention pourra, si nécessaire, couvrir la fin de la chute des feuilles. N'oubliez pas, la lutte chimique ne suffit pas. Les mesures prophylactiques au cours de la taille en sont un complément indispensable.

PECHER

DEPERISSEMENT BACTERIEN - 4ème traitement dès réception.

La lutte chimique seule ne suffit pas, il faut aussi :

- arracher et brûler les arbres morts ou dépérissants,
- ne plus planter les variétés classées très sensibles,
- tailler le plus tard possible (mars). Commencer par les variétés les moins sensibles. Désinfecter les outils de taille par trempage dans l'alcool à brûler entre chaque arbre.

POIRIER

PSYLLES - Dans les vergers les plus infestés intervenez sur les adultes fin octobre-début novembre.

Actuellement, quelques larves âgées terminent leur évolution, mais la plupart des adultes hivernants sont déjà présents.

L'infestation est très variable d'un verger à l'autre. L'intervention d'automne ne doit concerner que les vergers les plus infestés. Ailleurs, le traitement d'hiver devrait suffir.

Produits utilisables : les pyréthrinoides de synthèse homologués.